

FEMINELLA VAGI C®

Tabletki dopochwowe

Skład

Jedna tabletki dopochwowa zawiera: witaminę C (kwas askorbowy) 250 mg, żywicę silikonową, laktozę jednowodną, hydroksypropylometylocelulozę, magnezu stearynian.

Zastosowanie

Tabletki dopochwowe FEMINELLA VAGI C® opracowano w celu zapewnienia naturalnej ochrony mikrośrodowiska pochwy dzięki utrzymywaniu lub przywracaniu pH fizjologicznego. Po zastosowaniu tabletek dopochwowych FEMINELLA VAGI C® środowisko pochwy bardzo szybko zmienia się niedopuszczając do wzrostu niepożądanych bakterii beztlenowych odpowiedzialnych za rozwój bakteryjnego zapalenia pochwy, także w okresie ciąży. Tabletki dopochwowe FEMINELLA VAGI C® są stosowane pomocniczo w przypadku zapobiegania i leczenia bakteryjnego zapalenia pochwy. Tabletki są szczególnie przydatne u pacjentek z nawrotami choroby lub po zakończeniu terapii antybiotykowej.

Dawkowanie

Wprowadzić do pochwy jedną tabletkę dopochwową dziennie, najlepiej wieczorem przed snem. Zaleca się stosować tabletki, co najmniej przez 6 dni, aby przywrócić pH fizjologiczne i w celu odbudowy prawidłowej flory bakteryjnej pochwy. W razie potrzeby leczenie można przedłużyć lub powtórzyć.

Jak stosować FEMINELLA VAGI C®

Tabletki dopochwowe FEMINELLA VAGI C® należy wprowadzać głęboko do pochwy. Tabletki dopochwowe FEMINELLA VAGI C® chronią mikrośrodowisko pochwy poprzez kontrolowane kilkugodzinne uwalnianie witaminy C. Dzięki temu pH pochwy szybko osiąga wartość prawidłową, przy czym kwaśny odczyn utrzymuje się przez dłuższy czas.

Przeciwwskazania

Znana nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Ostrzeżenia

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Nie połykać.

Ciąża i karmienie piersią

Tabletki dopochwowe FEMINELLA VAGI C® mogą być bezpiecznie stosowane podczas ciąży i karmienia piersią.

Możliwe działania niepożądane

W rzadkich przypadkach może wystąpić uczucie pieczenia lub swędzenia pochwy. W bardzo rzadkich przypadkach może wystąpić nadwrażliwość na składniki preparatu; zaleca się wtedy zaprzestać stosowania preparatu i zasięgnąć porady lekarza.

Interakcje

Witamina C może zakłócać oznaczanie cukru w moczu, dehydrogenazy mleczanowej, transaminaz i bilirubiny. Witamina C zmniejsza działanie środków przeciwkrzepliwych.

Producent: POLICHEM S.A., Via Senago 42/D – 6912 Lugano Pazzallo, Szwajcaria.

Autoryzowany przedstawiciel: BIOSELECTA S.r.l., Via G. Marcora 11 – 20121 Mediolan, Włochy.

Dystrybutorem preparatu FEMINELLA VAGI C® w Polsce jest: Medagro International Sp. z o.o., ul. Podleśna 83, 05-552 Łazy

Przechowywać w miejscu chłodnym i suchym.