

## **FEMINELLA VAGI C®**

Tabletki dopochwowe

### **Skład**

Jedna tabletkowa dopochwowa zawiera: witaminę C (kwas askorbowy) 250 mg, żywicę silikonową, laktozę jednowodną, hydroksypropylometylocelulozę, magnezu stearynian.

### **Zastosowanie**

Tabletki dopochwowe FEMINELLA VAGI C® opracowano w celu zapewnienia naturalnej ochrony mikrośrodowiska pochwy dzięki utrzymywaniu lub przywracaniu pH fizjologicznego. Po zastosowaniu tabletek dopochwowych FEMINELLA VAGI C® środowisko pochwy bardzo szybko zmienia się niedopuszczając do wzrostu niepożądanych bakterii beztlenowych odpowiedzialnych za rozwój bakteryjnego zapalenia pochwy, także w okresie ciąży. Tabletki dopochwowe FEMINELLA VAGI C® są stosowane pomocniczo w przypadku zapobiegania i leczenia bakteryjnego zapalenia pochwy. Tabletki są szczególnie przydatne u pacjentek z nawrotami choroby lub po zakończeniu terapii antybiotykowej.

### **Dawkowanie**

Wprowadzić do pochwy jedną tabletkę dopochwową dziennie, najlepiej wieczorem przed snem. Zaleca się stosować tabletki, co najmniej przez 6 dni, aby przywrócić pH fizjologiczne i w celu odbudowy prawidłowej flory bakteryjnej pochwy. W razie potrzeby leczenie można przedłużyć lub powtórzyć.

### **Jak stosować FEMINELLA VAGI C®**

Tabletki dopochwowe FEMINELLA VAGI C® należy wprowadzać głęboko do pochwy. Tabletki dopochwowe FEMINELLA VAGI C® chronią mikrośrodowisko pochwy poprzez kontrolowane kilkugodzinne uwalnianie witaminy C. Dzięki temu pH pochwy szybko osiąga wartość prawidłową, przy czym kwaśny odczyn utrzymuje się przez dłuższy czas.

### **Przeciwwskazania**

Znana nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

### **Ostrzeżenia**

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Nie połykać.

### **Ciąża i karmienie piersią**

Tabletki dopochwowe FEMINELLA VAGI C® mogą być bezpiecznie stosowane podczas ciąży i karmienia piersią.

### **Możliwe działania niepożądane**

W rzadkich przypadkach może wystąpić uczucie pieczenia lub swędzenia pochwy. W bardzo rzadkich przypadkach może wystąpić nadwrażliwość na składniki preparatu; zaleca się wtedy zaprzestać stosowania preparatu i zasięgnąć porady lekarza.

### **Interakcje**

Witamina C może zakłócać oznaczanie cukru w moczu, dehydrogenazy mleczanowej, transaminaz i bilirubiny. Witamina C zmniejsza działanie środków przeciwkrzepliwych.

**Producent:** POLICHEM S.A., Via Senago 42/D – 6912 Lugano Pazzallo, Szwajcaria.

**Autoryzowany przedstawiciel:** BIOSELECTA S.r.l., Via G. Marcora 11 – 20121 Mediolan, Włochy.

**Dystrybutorem** preparatu FEMINELLA VAGI C® w Polsce jest: Medagro International Sp. z o.o., ul. Podleśna 83, 05-552 Łazy

**Przechowywać w miejscu chłodnym i suchym.**